Liste de coquilles recueillies par M. E. Aubert de la Rue aux iles Kerguelen, Saint-Paul et de la Nouvelle-Amsterdam (1931),

par M. Ed. Lamy.

M. Edg. Aubert de la Rue a recueilli en 1931 aux îles Kerguelen, Saint-Paul et de la Nouvelle-Amsterdam une petite série de coquilles : le Muséum de Paris possédait d'assez nombreux Mollusques de Kerguélen, grâce aux récoltes faites en 1909 par M. Rallier du Baty (1) et en 1913-14 par M. J. Loranchet (2), mais il n'avait pas de représentants de la faune malacologique de Saint-Paul et d'Amsterdam, étudiée jadis par Ch. Vélain (3).

Iles Kerguélen.

(février-mars 1931).

Hemiarthrum setulosum Carpenter mss., Dall (1876, *in* Kidder, *Nat. Hist. Kerguelen, Bull. U. S. Nat. Mus.*, III, p. 44). — Port Jeanne-d'Arc : 4 individus recueillis dans les trous de rochers dans les bancs de Moules.

Trophon Philippianus Dunker mss., Kobelt (1878, *in* Martini u. Chemnitz, *Conch. Cab.*, 2e éd., *Purpuracea*, p. 277, pl. LXXII, fig. 4-5). — Port Jeanne-d'Arc : 6 ind.

Lævilittorina caliginosa Gould [*Littorina*] (1849, *Proc. Boston Soc. Nat. Hist.*, III, p. 83). — Port Jeanne-d'Arc : 17 ind.

Margarella expansa Sowerby [*Margarita*] (1837, *Conchol. Illustr.*, fig. 16-17). — Isthme de Port Jeanne-d'Arc : 3 ind. recueillis sur fond de sable par grande marée.

Nacella (Patinella) kerguelenensis E. — A. Smith [*Patella*] (1879, *Moll. Kerguelen, Phil. Trans. R. Soc. London*, CLXVIII,

(1) 1910, Ed. Lamy, *Bull. Mus.*, XVI, pp. 198-204.
(2) 1915, *ibid.*, XXI, pp. 68-76.
(3) 1877, Ch. Vélain, *Archiv. Zool. exp. et gén.*, VI, pp. 1-144, pl. II-V.

p. 177, pl. IX, fig. 13-13 *a*). — Baie des Swains : 5 ind.; Port Jeanne-d'Arc : 13 ind.

Nacella (Patinella) fuegiensis Reeve [*Patella*] (1855, *Conch. Icon.*, VIII, *Patella*, pl. XXVIII, fig. 73 *a-b*). — Port Jeanne-d'Arc : 8 ind.

Siphonaria lateralis Couthouy mss., Gould (1846, *Proc. Boston Soc. Nat. Hist.*, II, p. 153). — Port Jeanne-d'Arc : 5 ind.; Chenal de Buenos-Ayres : 10 ind.

Siphonaria redimiculum Reeve (1856, *Conch. Icon.*, IX, *Siphonaria*, pl. V, fig. 24 *a-b*). — Port Jeanne-d'Arc : 2 ind.

Endodonta (Amphidoxa) Hookeri Reeve [*Helix*] (1854, *Conch. Icon.*, VII, *Helix*, pl. CCVIII, fig. 1474). — Dôme Rouge : nombreux individus.

Mytilus magellanicus Chemnitz (1783, *Conch. Cab.*, VIII, p. 162, pl. LXXXIII, fig. 472-473). — Port Jeanne-d'Arc : 3 ind. et 3 valves.

Modiolarca trapezina Lamarck [*Modiola*] (1819, *Anim. s. vert.*, VI, 1re p., p. 114). — Port Jeanne-d'Arc : 1 ind.

Modiolarca minuta Dall [*Kidderia*] (1876, Kidder, *Nat. Hist. Kerguelen, Bull. U. S. Nat. Mus.*, III, p. 46). — Kerguelen : 1 ind.

Lasæa rubra Montagu [*Cardium*] (1803, *Test. Brit.*, p. 83, pl. suppl. XXVII, fig. 4). — Port Jeanne-d'Arc : 13 ind.

Cyamium commune Thiele (1912, *Deutsche Südpolar Exped.*, 1901-1903, Bd. XIII, Zool. V, p. 255, pl. XVIII, fig. 22-22*a*). — Isthme de Port Jeanne-d'Arc : 15 ind.

Anatina elliptica King et Broderip (1831, *Zool. Journ.*, V, p. 335). — Isthme de Port Jeanne-d'Arc : 10 ind. recueillis par grande marée sur fond de sable.

Ile Saint-Paul

(avril 1931).

Ischnochiton Bergoti Vélain [*Chiton*] (1877, *Arch. Zool. exp.*, VI, p. 123, pl. IV, fig. 19-20). — Saint-Paul : 4 ind.

Murex (Ocinebra) Hermanni Vélain (1877, *Arch. Zool. exp.*, VI, p. 99, pl. II, fig. 3-4). — Saint-Paul : 1 ind. recueilli à marée basse sur les rochers au fond du cratère.

Murex (Ocinebra) tritonidea Vélain [*Trophon*] (1877, *Arch. Zool. exp.*, VI, p. 101, pl. II, fig. 6-7). — Saint-Paul : 1 ind. recueilli à marée basse sur les bords du cratère.

Purpura Dumasi Vélain (1877, *Arch. Zool. exp.*, VI, p. 102, pl. II, fig. 12-15). — Saint-Paul : une centaine d'ind. recueillis à marée basse sur les rochers au fond du cratère et appartenant aux variétés *mullistriata, semicostata, cincta.*

Purpura Magellani Vélain (1877, *Arch. Zool. exp.*, VI, p. 104, pl. II, fig. 8-9). — Cratère de l'île Saint-Paul : 16 ind., à coquille élancée, correspondant à la forme typique.

Ranella (Argobuccinum) proditor von Frauenfeld [*Bursa*] (1865, *Verhandl. Zool. Botan. Gesell. Wien*, XV, p. 894; 1877, Vélain, *Arch. Zool. exp.*, VI, p. 100, pl. II, fig. 5). — Saint-Paul : 4 ind.

Gibbula Lacazei Vélain [*Margarita*] (1877, *Arch. Zool. exp.*, VI, p. 118, pl. IV, fig. 4-5). — Saint-Paul : 25 ind. recueillis à marée basse sur les bords du cratère.

Phasianella Velaini nov. nom. = *Ph. brevis* Vélain (1877, *Arch. Zool. exp.*, VI, p. 117, pl. IV, fig. 3). — Saint-Paul : 1 ind. recueilli à marée basse sur les bords du cratère. — Je propose d'appeler *Ph. Velaini* cette petite coquille naticiforme, d'une coloration rose carminée, car il existait déjà antérieurement deux *Phasianella brevis*, l'un de C. B. Adams (= *Ph. affinis* C. B. Ad.), l'autre de d'Orbigny (= *Ph. brevissima* Tryon).

Helcioniscus depstus Reeve [*Patella*] (1855, *Conch. Icon.*, VIII, *Patella*, pl. XXXI, fig. 85 *a-b*; 1877, Vélain, *Arch. Zool. exp.*, VI, p. 122, pl. IV, fig. 13-15). — Saint-Paul : 8 ind.

Fissurella mutabilis Sowerby (1834, *P. Z. S. L.*, p. 127; 1835, *Conchol. Illustr.*, fig. 67-70; 1877, Vélain, *Arch. Zool. exp.*, VI, p. 121, pl. IV, fig. 11-12). — Saint-Paul : 11 ind. recueillis à marée basse au fond du cratère.

Glyphis australis Krauss [*Fissurella*] (1848, *Südafrik. Moll.*, p. 67, pl. IV, fig. 10; 1877, Vélain, *Arch. Zool. exp.*, VI, p. 120, pl. IV, fig. 9-10). — Saint-Paul : 5 ind. recueillis à marée basse au fond du cratère.

Marinula nigra Philippi var. minor Vélain (1877, *Arch. Zool. exp.*, VI, p. 125, pl. IV, fig. 25). — Saint-Paul : 3 ind. recueillis à marée basse sur les bords du cratère.

Lasæa rubra Montagu [*Cardium*] (1803, *Test. Brit.*, p. 83, pl. suppl. XXVII, fig. 4). — Saint-Paul : très nombreux ind. recueillis sur les rochers du pourtour du cratère.

Ile de la Nouvelle-Amsterdam.

(avril 1931).

Purpura Magellani Vélain (1877, *loc. cit.*). — Amsterdam : 1 ind. de la variété plus courte et plus renflée.

Ranella (Argobuccinum) proditor von Frauenfeld [*Bursa*] (1865, *loc. cit.*; 1877, Vélain, *loc. cit.*). — Amsterdam : 1 ind.

Gibbula Lacazei Vélain [*Margarita*] (1877, *loc. cit.*). — Amsterdam : 2 ind.

Helcioniscus depstus Reeve [*Patella*] (1855, *loc. cit.*; 1877, Vélain, *loc. cit.*). — Amsterdam : nombreux ind. sur les rochers au bord de la mer.